

人民日报社论

勤奋劳动 诚实劳动 创新劳动

——庆祝“五一”国际劳动节

光荣属于伟大的劳动者。今天，我国工人阶级和劳动群众迎来了自己的节日——“五一”国际劳动节。我们向全国工人阶级和劳动群众致以节日的祝贺，向各条战线上的劳动模范和先进工作者表示崇高的敬意！

平凡孕育伟大，劳动创造世界。今年是中国共产党成立90周年。在波澜壮阔的90年历程中，我们党始终是中国工人阶级的先锋队，工人阶级是我们党始终依靠的中坚力量。90年来，工人阶级和广大劳动群众紧紧跟随党的前进步伐，以彻底的革命精神和蓬勃的创造力量，积极投身革命、建设、改革的时代洪流，为实现民族独立和人民解放、国家富强和人民幸福作出了不可磨灭的历史性

贡献。历史雄辩地证明，中国工人阶级和劳动群众是推动我国社会全面进步的根本力量，是中国特色社会主义伟大事业的胜利之本。

当前，我国进入了新的发展阶段，但无论经济社会面貌如何改变，无论科技进步和知识更新达到何种程度，劳动依然是中国社会发展的主导因素。如果说过去是劳动者用自己的双手，推动中国取得举世瞩目的伟大成就、赢得举足轻重的国际地位；那么在世情国情发生深刻变化的今天，工人阶级和广大劳动群众的奉献与奋斗，依然关系到国家目标的实现，关系到中国未来的发展，关系到亿万中国人民的光荣与梦想。

今年是“十二五”的开局之年。“十二五”是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。面对机遇和挑战，中国可以大有作为，也必须奋发有为。新形势和新任务，要求工人阶级和广大劳动群众继承和发扬光荣传统，以高度的历史主动性，勤奋劳动、诚实劳动、创新劳动，自觉投身社会主义现代化建设的伟大实践。在经济体制深刻变革、社会结构深刻变动、利益格局深刻调整、思想观念深刻变化的发展新阶段，以勤奋劳动成为科学发展的实践者和主力军；在价值追求多元、多样、多变的社会转型期，以诚实劳动引领社会风尚、促进社会和谐；在我国内外环境、增长机制发生

重大变化的条件下，以创新劳动加快转变经济发展方式、建设创新型国家。这是时代赋予中国工人阶级的崇高使命，具有光荣传统的中国工人阶级一定能够与时俱进、锐意进取，更好地发挥改革主力、发展动力、稳定基石的作用。

党和国家事业的发展进步，离不开广大劳动者的创造力量；党的全部执政活动，离不开强有力的群众工作。紧紧依靠和切实关心广大劳动者，是党的群众路线最重要最根本的体现。各级党委和政府要加强和改进对工会工作的领导，把更多的资源和手段赋予工会组织，始终站在工人阶级和劳动群众的立场上，切实解决他们最关心最直接最现实的利

益问题。各级工会组织和广大工会干部要坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路，继续依法推动企业普遍建立工会组织、普遍开展工资集体协商，积极构建社会主义和谐劳动关系，不断实现好、维护好、发展好广大劳动群众的根本利益。

劳动是一切幸福的源泉。生活的美好，社会的进步，源于平凡艰辛的劳动。回首过去，“中国奇迹”的创造、“中国震撼”的交响，无不凝聚着广大劳动者的智慧和汗水。在历史的新起点上，以更大的劳动热情和创造活力投身中国特色社会主义伟大事业，中国工人阶级和劳动群众必将书写更加灿烂辉煌的篇章。（新华社北京4月30日电）



▲上海：劳模风采展示进地铁

4月30日，上海地铁徐家汇站内展示的劳模李斌、包起帆、徐小平的形象宣传灯箱，在人民广场、徐家汇、中山公园等人流密集的地铁换乘通道内进行公益宣传展示，旨在扩大劳模精神的影响力和号召力。



▲重点工程建设者的承诺

4月30日，中铁四局的党员和劳动模范展示先锋工程旗帜。“五一”国际劳动节来临之际，奋战在国家重点工程京福铁路客运专线、合肥南



▲老劳模现身说教

4月30日，电影《今天我休息》中的优秀民警马天民的原型，全国劳动模范、全国公安系统一级英模马人俊（左）为新民警赠言。当日，由上海市公安局主办的“发扬传统、坚定信念、执法为民”主题教育实践活动在上海举行。8位全国劳动模范以切身心得体会勉励1200名新民警端正理想信念，走好从警每一步。



本栏文图均为新华社发



恽代英

恽代英，原籍江苏武进，1895年生于湖北武昌。1915年，进入中华大学学习。这一年，陈独秀创办了著名的《青年杂志》(第二卷改为《新青年》)，恽代英受它影响积极投身革命活动。

1921年，恽代英加入中国共产党。1923年夏，他应邓中夏之约，来到上海，在党创办的上海大学任教。不久，出席在南京召开的中国社会主义青年团第二次代表大会，当选团中央执委会委员、宣传部部长。

1925年，上海爆发了反对帝国主义的“五卅”运动，他参与领导“五卅”爱国运动。1926年1月，在国民党二大上当选国民党中央执行委员。不久，中国共产党为加强在黄埔军校的工作，派他担任军校政治主任教官，兼任军校中共党团干事。

1927年12月，恽代英参与领导广州起义，任广州苏维埃政府秘书长，在张太雷牺牲的不利情况下，他临危不惧、沉着镇静地指挥战斗。广州起义失败后，他奉命撤退到香港，组织寻找和转移起义失败后流落香港的同志。

1930年5月6日，恽代英在上海被国民党当局逮捕。1931年4月29日，被国民党反动派杀害于南京，时年36岁。

李四光

李四光，字仲揆，著名地质学家、教育家和社会活动家，我国现代地球科学和地质工作奠基人。李四光1889年10月26日出生于湖北省黄冈县，1904年留学日本，1905年参加孙中山领导的同盟会成为中国同盟会成员之一。1931年在英国爱丁堡大学获科学博士学位。

1950年，李四光自英国回到百废待兴的祖国，先后任中国科学院副院长、地质部部长、第一届全国政协委员、第二和第三届全国政协副主席、中国科学技术协会主席等职务。


1958年，经何长工、张劲夫介绍，李四光加入中国共产党，由一个民族主义者成为共产主义战士，同年当选为苏联科学院外籍院士。

为解决经济建设能源紧缺问题，李四光运用自己创建的地质力学理论和方，组织指导石油地质工作，为大庆、胜利、大港等我国东部一系列大油田的勘探与发现，为摘掉我国“贫油”的帽子和石油工业的发展作出了重大贡献。李四光指导铀等放射性矿产勘查取得突破性进展，为发展我国核工业和“两弹一星”作出了重要贡献。

1971年4月29日，李四光在北京逝世。（均据新华社电）

标题新闻

- 日本众议院通过首个赈灾补充预算案
 - 奥巴马下令对叙利亚高官和机构实施制裁
 - 阿巴斯说巴勒斯坦过渡政府将不负责谈判事务
 - 美国“奋进”号航天飞机因技术故障推迟发射
 - 墨西哥国会通过新移民法
- 均据新华社电



强风暴肆虐美国南部

一些地区进入紧急状态

据新华社北京4月30日电 连日来肆虐美国南部地区的强风暴天气已经导致329人丧生。亚拉巴马、密西西比、田纳西、弗吉尼亚、阿肯色、佐治亚、肯塔基、密苏里、俄克拉何马等州已宣布进入紧急状态，并动员国民警卫队参与搜救和善后工作。

亚拉巴马州受灾最严重。该州州长罗伯特·本特利说，亚拉巴马州确认死亡人数已达200多人，另有1700人受伤，数人失踪。此外，密西西比、田纳西、佐治亚、弗吉尼亚、阿肯色、肯塔基等州也有不同程度的

人员伤亡。

在亚拉巴马州，人口只有9万多的塔斯卡卢萨市遭受重灾，目前已有至少37人死亡，其中包括数名学生。27日晚龙卷风袭击该市造成巨大破坏后，市区出现了哄抢现象。市长沃尔特·马多克斯28日宣布，塔斯卡卢萨市区28日晚10时至29日早上6时实行宵禁。宵禁在29日晚8时至30日早晨6时将继续实行。宵禁将由警方和国民警卫队负责实行，违反宵禁令者将被逮捕。

强风暴导致美国南部地区近100万户断电。一些灾民已返回家中，忍受断电的生活。一些人房屋遭毁，只能住在避难所内。亚拉巴马州当局29日清晨派人前往塔斯卡卢萨市，帮助幸存者收集残留物品。

风暴还导致亚拉巴马州一家核电站电力供应受到影响，部分反应堆自动关闭。美国核能安全部门表示正在密切关注事故进展情况。

联邦紧急措施署署长富盖特推测死亡人数还会增加，现阶段各地当局专注于救援和重建。

美国总统奥巴马28日与国土安全部长珍妮特·纳波利塔诺、联邦紧急措施署署长克雷格·富盖特通电话，讨论联邦政府赈灾救援行动，要求相关部门采取积极全面的救灾行动。

流行性腮腺炎防治小知识

流行性腮腺炎（简称腮腺炎）是由腮腺炎病毒引起的呼吸道传染病。我国中医称腮腺炎为“痄腮”，早在公元前640年，医书上就有关于本病的记载。人是腮腺炎病毒的唯一自然宿主。腮腺炎患者和健康带毒者是本病的传染源。

腮腺炎主要在儿童和青少年中发生，尤以5~15岁患者较为多见，2岁以下、40岁以上的人很少发病。孕妇感染后，病毒可通过胎盘导致胎儿先天感染，从而引起胎儿畸形。青春期中受感染后，除腮腺炎外还可继发卵巢炎、睾丸炎、心肌炎、乳腺炎等。腮腺炎在冬春季发病较多，但全年都可发生感染流行。常在托儿所、幼儿园、学校和新兵中爆发。大约每2年发生一次流行。一次感染后可获得终身免疫，但个别抗体水平低下者，亦可再次感染。

流行性腮腺炎的病原是腮腺炎病毒，属RNA病毒的副粘病毒科。病毒的感染性可被乙醚、氯仿、福尔马林、20分钟及紫外线所灭活，在-70℃的环境中可以存活数年。

腮腺炎由患者和健康带毒者的唾液或呼吸道分泌液沫经空气传播。被患者和健康带毒者唾液污染的食具或玩具，在短时间内接触到易感者的口腔亦可引起感染。本病潜伏期14~21天，平均有18天。病毒侵入上呼吸道粘膜并在局部生长繁殖，通过血流传到腮腺及其他器官，亦可经口腔沿腮腺管传到腮腺，在腮腺肿大前6天至发病后5天或更长的时间内

排出病毒。亦可经结膜分泌物和尿液排出病毒。患者发病最初1~2天，还会从白细胞中发现病毒。

患者受感染后，大多无前驱症状，部分患者可有倦怠、畏寒、食欲不振、低热、头痛等症状，其后则出现一侧腮腺肿大或两侧腮腺同时肿大，2~3日内达到高峰，面部一侧或两侧因肿大而变形，局部疼痛、过敏，开口及咀嚼时疼痛明显，含酸性食物胀痛加剧，常可波及邻近的颌下腺。舌下腺及颈部淋巴结。腮腺肿大可持续5日左右，以后逐日减退，全部病程约7~12日。白细胞计数有时可稍减少，淋巴细胞相对增多。青春期中性患者有时并发睾丸炎，发生率为20%。睾丸炎常发生在腮腺炎起病后的4~5天，肿大的腮腺消退时，开始为睾丸疼痛，随之肿胀伴触痛。有些患者症状较轻，但大多数病人有严重的全身反应，包括高热、寒战、头痛、背痛等，急性期症状可持续3~4天，约10天左右消退。病变大多侵犯一侧睾丸，双侧睾丸炎发生率为16%~30%。病毒的感染性可被乙醚、氯仿、福尔马林、20分钟及紫外线所灭活，在-70℃的环境中可以存活数年。

腮腺炎由患者和健康带毒者的唾液或呼吸道分泌液沫经空气传播。被患者和健康带毒者唾液污染的食具或玩具，在短时间内接触到易感者的口腔亦可引起感染。本病潜伏期14~21天，平均有18天。病毒侵入上呼吸道粘膜并在局部生长繁殖，通过血流传到腮腺及其他器官，亦可经口腔沿腮腺管传到腮腺，在腮腺肿大前6天至发病后5天或更长的时间内

症状一般较轻，预后良好，多在2周内恢复正常，无后遗症。

腮腺炎患者应注意口腔清洁，清淡饮食，忌酸性食物，多饮水。对高热、头痛、呕吐者，应给予解热止痛、脱水剂等对症治疗。中药治疗多用清热解毒，软坚消痛等制剂口服，局部敷用消肿止痛药。对重症患者或同时伴有脑膜炎或睾丸炎者，可考虑用肾上腺皮质激素治疗，以缓解症状。

流行性腮腺炎预防

一、传染源的管理：早期发现患者，早期进行隔离，隔离期一般认为应从起病至腮腺完全消退为止，约3周左右。由于腮腺炎病毒对外界的各种物理因素抵抗力较低，故不需终末消毒，但被患者污染的饮具、食具仍需煮沸消毒。合理使用口罩，也可作为切断传播途径的有效办法。对一般接触者可不检疫，但对集体儿童、学校、部队、接触者应检疫3周。

二、接种腮腺炎疫苗是预防流行性腮腺炎最有效、最经济的办法。腮腺炎病毒灭活疫苗对儿童有保护作用，自然感染保护作用达95%，保护性免疫至少持续6年。目前，我国已将流行性腮腺炎纳入扩大国家免疫规划管理，在儿童1.5~2岁时，接种麻疹—风疹—腮腺炎三联疫苗一剂次。

三、孕妇应避免与腮腺炎病人接触，在腮腺炎流行季节应注意隔离。如孕妇在临产期或围产期患腮腺炎，婴儿应隔离并停止哺乳。

计划免疫系列宣传(之六)

周口市疾病预防控制中心主办

一、百日咳是由什么细菌引起的？

百日咳是由百日咳嗜血杆菌感染引起的急性呼吸道传染病，传染性很强。

二、百日咳的临床特征？

百日咳临床特征为咳嗽逐渐加重，渐呈阵发性痉挛性咳嗽，咳毕有鸡鸣声，病程延续2~3个月。婴幼儿及重症常并发肺炎及百日咳脑病。

三、百日咳嗜血性杆菌的特点？

百日咳杆菌为短杆状或椭圆形，长约0.3~0.5mm。革兰氏染色阴性，两端着色较深。含内毒素和外毒素，对一般理化因子抵抗力甚弱，30分钟、日照1小时即可致死。在干燥尘埃中能存活3天。对氯霉素、红霉素等敏感，对青霉素和磺胺药有抵抗力。本菌存在于患者呼吸道和鼻咽分泌物中，应尽早取标本，以利取得阳性结果。

四、百日咳的传染源和传播途径是什么？

患者是百日咳唯一的传染源。自潜伏期末至病后6周均有传染性，以发病第一周传染性最强，其传染期约1半个月，患者咳嗽及喷嚏飞沫经呼吸道传播，是主要途径。人群普遍易感，但幼儿发病率最高。母体无足够的保护性抗体传给胎儿，故6个月以下婴幼儿发病较多。病后可获持久免疫力，第二次发病者罕见。

五、百日咳的临床表现？

潜伏期1~2周，最长可达21天，咳嗽为突出表现，分为3个时期，全病程约6~8周。

初起表现为呼吸道症状，有

轻微的咳嗽、鼻炎等，约2周时间，称为卡他期。其后咳嗽加剧，患儿连续咳嗽不止，头颈部静脉充血，面红耳赤或上唇紫绀和流鼻涕。随后咳嗽停止，大量粘液或脓痰由气管排除，伴有呕吐，此时由于肺内缺氧，不得不吸一口长气而发出特殊高调的鸡鸣样吼声，如此发作，每日数次，多至10次，一般为4~6周，为痉咳期。痉咳期一般不发烧，如果有高烧，则可能有继发感染。最常见的合并症为肺炎，是百日咳患者死亡的主要原因。进入恢复期，咳嗽次数明显减少，至咳吐消失，逐渐恢复正常。但有百日咳疫苗接种史的儿童和成人，症状一般不典型。新生儿及小月龄婴儿的初次感染没有明显的痉咳，可表现为呼吸窒息和咳嗽发作。

六、百日咳并发症有哪些？

1.肺部并发症：支气管肺炎为婴幼儿常见并发症，常在痉咳期发生。

2.百日咳脑病：反复痉咳使胸腔内压增高，颈静脉回流障碍，使脑充血，甚至出血。

3.结核病恶化：百日咳可使原有肺结核恶化，甚至引起血行播散，而发生全身粟粒性结核病，或结核性脑膜炎。

七、百日咳如何进行治疗？

患者百日咳发病后，应尽早给予抗生素治疗，如红霉素和氯霉素等。对症治疗，防止并发症的发生。对病人的隔离，应隔离发病后40天，或至痉挛性咳嗽出现后30天，接触者观察21天。

八、百日咳如何进行预防？

1.隔离病人：早期诊断，早期隔离，以防止本病扩散，隔离期

间从起病之日计算7周，从痉咳开始计算4周。对有密切接触的易感儿，检疫3周。

2.健康教育：百日咳是严重影响婴幼儿健康的传染病，但又是可用疫苗预防的传染病，对易感儿童实施百白破三联混合疫苗接种，便可预防本病的发生。家长要注意在婴儿出生后第三个月及时到当地卫生防疫部门接种百白破三联疫苗。百日咳流行期间，家长要少带幼儿出门，不到公共场所活动，减少感染的机会。

3.保护易感儿：

①自动免疫：百日咳疫苗是与白类和破类联合制成，该疫苗经多年的实际应用，效果良好。按我国常规免疫程序，儿童出生后第三个月开始初免，全程3针，间隔至少28天，保护率可达90%以上，第二年加强1针，每次0.5毫升。含百日咳疫苗的各种制剂于20℃~80℃储运，不能冻结。吸附百白破的效期自吸附之日起1年半。吸附无细胞百白破自吸附之日起效期2年。

②预防服药：对密切接触易感儿可给予红霉素、氨卡青霉素或复方新诺明治疗。

③被动免疫：婴儿及体弱儿接触本病后，可给予免疫球蛋白治疗。

4.流行期措施：及时报告疫情，隔离病人，密切观察接触者，对易感人群实施应急接种疫苗，对患者及早用青霉素或氯霉素治疗。（蒋文）

计划免疫系列宣传(之七)

周口市疾病预防控制中心主办