


京广高铁郑州至武汉段正式通车运营



本报综合消息 9月28日，京广高铁郑州至武汉段正式通车运营，郑州东站也同时建成启用。武汉至郑州间火车运行时间由原来的最快4小时28分钟缩短至1小时56分钟。今后，郑州市民乘高铁去长沙、广州、深圳的时间将缩短一半还多。

郑武高铁运营里程536公里，设计时速350公里，初期运营时速300公里。全线设有郑州东、许昌东、漯河西、驻马店西、明港东、信阳东、孝感北、横店东8个车站，在武汉站与武广高铁相连。

郑州至武汉段与已运营的郑州至西安、武汉经广州到深圳、武汉至合肥、合肥至南京等高铁连为一体，实现中原、长三角、珠三角高铁与西安等西部地区高铁的联通成网。

28日，首发列车一票难求。很多旅客说，早晨在郑州喝一碗胡辣汤，中午到达武汉吃一碗热干面，晚上就可以回到北京吃豆腐脑。

图为9月28日，一列郑州东站首发武汉的动车组从京广高铁郑武段河南省新郑市驶过。
新华社记者 赵鹏 摄

今年中秋：
十五的月亮十五圆

新华社南京9月28日电
(记者蔡玉高 周润健)今年中秋夜公众可赏八月最圆月。中科院紫金山天文台研究员王思潮向记者通报，今年农历八月月亮最圆的具体时刻为30日11时19分。

王思潮介绍，月球绕地球转动一周为一个“朔望月”，“朔”为农历每月初一，这时月亮正处于太阳与地球之间，月亮和太阳黄经相同，人们从地球上看不到背向阳光的月亮。“望”通常为农历每月十五或十六，这时地球正好位于太阳与月亮之间，太阳和月亮黄经差180度，人们从地球上看到太阳西下时月亮正好从东方升起，月亮此时最亮、最圆。

王思潮解释，月亮围绕地球运行的轨道是一个椭圆，时近时远；最近时有36万多千米，最远时有40多万千米，由于万有引力的关系，近时走得快一些，远时走得慢一些。如果在上半个月快了，就会准时到达圆月的位置，在十五圆；如果慢了，就会“晚点”，赶在十六或十七到达圆月的位置。

王思潮介绍，俗话说“十五的月亮十六圆”，但事实上根据粗略统计，满月出现在十五的概率是5%，出现在十六的概率是40%，剩下10%左右的概率会出现在十四和十七。

记者了解到，从2002年到2005年，连续4年，中秋月都圆在农历八月十五；但是从2006年开始，连续4年，中秋最圆月都出现在十六；去年和今年则又是“十五的月亮十五圆”。

关爱空巢老人 喜迎中秋佳节



9月28日，警员为驻地91岁的空巢老人陈桂英(左前)送上月饼和水果。

当日，福建省公安边防总队司令部边防拘留审查所官兵为驻地空巢老人送上月饼、水果，并邀请联欢，对他们表达节日的祝福。

新华社记者 张国俊 摄

双节到，大戏百姓门前闹



9月27日，赣剧演员在鄱阳县群众表演。

临近中秋节，江西特色剧种赣剧的发源地鄱阳县专门组织各乡镇赣剧团在市民广场搭起舞台，开展比赛，将最优秀的剧目送到群众家门前，大大丰富了百姓的文化生活。

新华社记者 周密 摄

8旬老人吃月饼噎住窒息身亡

本报综合消息 9月24日中午11点，长沙市120急救中心接到电话，家住香樟路中南院东区的赵先生称，82岁的父亲赵伯民被一小块月饼噎住，跟他说话没有任何反应。15分钟后，急救车赶到赵先生的家，急救医生称，当时赵伯民的呼吸和心跳均已停止，尽管采取了急救措施，但病人已经没有任何反应。随后，医生开具了死亡证明。

赵先生告诉记者，春节过后，父亲因脑梗塞等疾病，不能吃较硬的食物。直到9月初，赵爹爹的病情才有所好转，能与家人正常交流。

中秋节快到了，亲戚来串门，

长沙市中心医院急救中心的医

“就给他吃了一点月饼”。但让赵先生没想到的是，“爸爸刚咬月饼没几口，脸色就不对了”。家人先把他口腔内大部分的月饼抠出来，并拍了拍他的背，“能试过的办法都试过了”。但赵爹爹没能坚持多久，就没有生命的迹象，“怎么喊都喊不忈”。

赵先生很自责，认为是自己的疏忽，“看到他稍微好些，我就大意了”。中秋节本是合家团圆的节日，赵先生悲伤地说：“父亲没等到团圆，就先离开了我们。”月饼竟成了父亲离世的“导火索”。

长沙市中心医院急救中心的医

生谢燕飞说，赵爹爹不是完全窒息而死，月饼呛到喉咙是死亡的诱因。医生提醒，月饼这类比较硬的食物，要少给老人食用。

提醒：紧急抢救应快速按压腹部

当老人被食物噎住时，该用哪种方法进行紧急处理？

赵爹爹吃月饼被噎住时，家人首先是把他口腔的食物抠出来。谢燕飞提醒，拍打背部或将手指伸进嘴内去抠，这些办法其实无法清理出食道异物，甚至可能使异物更深入。遇到类似情况，应采取“哈姆立克急救法”，快速按压其腹部。

意识尚清醒的病人，可采用立

位或坐位，抢救者站在病人背后，双臂环抱病人，一手握拳，使掌关节突出点顶住病人腹部正中线脐上部位，另一只手的手掌压在拳头上，连续快速向内、向上推压冲击6次-10次(注意不要伤其肋骨)。

昏迷倒地的病人，采用仰卧位，抢救者骑跨在病人髋部，按上法推压冲击脐上部，使阻塞气管的食物上移并被驱出。如果无效，隔几秒钟后，可重复操作一次，造成人为的咳嗽，将堵塞的食物团块冲出气管。

(黎棠 邹晨莹)

广告